(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Januar 2002 (17.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/04487 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

C07K 14/00

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/07973

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. Juli 2001 (11.07.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 33 505.5

11. Juli 2000 (11.07.2000)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): IPF PHARMACEUTICALS GMBH [DE/DE]; Feodor-Lynen-Strasse 31, 30625 Hannover (DE).


(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FORSSMANN, Wolf-Georg [DE/DE]; Blücherstrasse 5, 30175 Hannover (DE). CONEJO-GARCIA, Jose-Ramon [ES/DE]; Feodor-Lynen-Strasse 31, 30625 Hannover (DE). ADER-MANN, Knut [DE/DE]; Feodor-Lynen-Strasse 31, 30625 Hannover (DE).
- (74) Anwälte: MEYERS, Hans-Wilhelm usw.; Postfach 1022 41, 50462 Köln (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING AND USING NOVEL HUMAN DEFENSINS AS BIOLOGICALLY ACTIVE PRO-TEINS FOR TREATING INFECTIONS AND OTHER ILLNESSES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR GEWINNUNG UND ANWENDUNG NEUER HUMANER DEFENSINE ALS BIOLO-GISCH AKTIVE EIWEISSTOFFE ZUR BEHANDLUNG VON INFEKTIONEN UND ANDEREN ERKRANKUNGEN



(57) Abstract: The invention relates to novel peptides taken from human blood, hBD-5 (human beta-defensin 5), hBD-6, hBD-7, hBD-8, hBD-10, hBD-11, hBD-12, hBD-13, hBD-14, hBD-15, hBD-16, hBD-17, hBD-18, hBD-19, hBD-20, hBD-22, hBD-23, hBD-24, hBD-25, hBD-26, hBD-27, hBD-28, hBD-29, hBD-30, hBD-31 and hBD-32 and the derivatives thereof, the structure of the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having the same having been elucidated so that they can be good the many in the same having the same h the same having been elucidated so that they can be used therapeutically, diagnostically and commercially as medicaments. Said peptides can be produced by means of biotechnological, recombinant methods and chemical synthesis, and can be proteolytically derived from corresponding precursor proteins.

SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Verfahren zur Gewinnung und Anwendung neuer humaner Defensine als biologisch aktive Eiweisstoffe zur Behandlung von Infektionen und anderen Erkrankungen

Die Erfindung betrifft Peptide vom human Defensintyp, ein Verfahren zur Gewinnung von dieser Peptide in reiner oder partiell aufgereinigter Form aus menschlichen und tierischen Körperflüssigkeiten, die die Fähigkeit besitzten, die bakterielle Invasion bei Entzündungserkrankungen zu verhindern, Nukleinsäuren, die für diese Peptide kodieren, Arzneimittel enthaltend diese Peptide, sowie Verwendungen dieser Peptide zur Behandlung verschiedener Erkrankungen.

Diese Peptide lassen sich insbesondere aus Haemofiltrat oder Haemodialysat aus menschlichem und tierischem Blut gewinnen. Diese Stoffe sind als humane Defensine klassifiziert und können zum Zwecke (1) der medizinischen und gewerblichen Verwendung als Medikament und (2) der Analyse von Erkrankungen benutzt werden.

Die Stoffe mit den Kurzbezeichnungen hBD-5 (humanes beta-Defensin-5), hBD-6, hBD-7, hBD-8, hBD-10, hBD-11, hBD-12, hBD-13, hBD-14, hBD-15, hBD-16, hBD-17, hBD-18, hBD-19, hBD-20, hBD-22, hBD-23, hBD-24, hBD-25, hBD-26, hBD-27, hBD-28, hBD-29, hBD-30, hBD-31 und hBD-32, wurden erstmals aus dem Haemofiltrat Nierenkranker nach Ultrafiltration am Haemodialyseapparat gewonnen und über einen antibakteriellen Hemmtest funktionell charakterisiert. Zur Darstellung der Defensinpeptide wurde ein patentiertes Verfahren (Forssmann, 1988; DE 3633707 C1) verfeinert, welches zuvor für Gewinnung von Eiweißstoffen aus Haemofiltrat erfunden wurde. Aus den mit diesem Verfahren gewonnenen Molekülen mit einem Molekulargewicht unter 20 kDalton, die bei veno-venöser oder arterio-venöser Shuntverbindung abfiltriert werden, können die Peptidfraktionen enthaltend die humanen Defensinpeptide durch einen Funktionstest erkannt werden. Das bisher bekannte Verfahren wurde benutzt, um die Rohpeptidextrakte zu gewinnen,

15

20

25

30

mit denen bei der Anwendung des LEHRERschen Radialdiffusionstest ein starker Effekt festgestellt wurde, indem das Wachstum von Bakterien in Kultur unter dem Einfluss dieser Substanz stark gehemmt wird.

Es wurde weiter festgestellt, dass bei weiteren Reinigungsverfahren diese biologischen Aktivitäten konzentriert werden konnten, bis schließlich verschiedene einheitliche Eiweißstoffe identifiziert und in ihrer Struktur aufgeklärt wurden. Vorteilhafterweise können diese Stoffe aus dem bisher als wertlos betrachteten Haemofiltrat aufgereinigt werden, um als wirtschaftlich verwertbare Substanzen benutzt zu werden. Die erfindungsgemäßen Peptide lassen sich durch chemische Synthese und durch gentechnologische Produktion gewinnen, sie lassen sich einsetzen u.a. als pathognomonisches Diagnosemerkmal für die Analyse von entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-, Respirations- und Urogenitaltraktes sowie anderer Epithelorgane.

15

wobei Z_N ein Aminosäurerest oder ein Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren ,

20 Z_c ein Aminosäurerest oder ein Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren,

X = eine beliebige Aminosäure

 $X_m = 3-6$ beliebige Aminosäuren

 $X_n = 2-3$ Aminosäuren

 $X_o = 5-9$ Aminosäuren

 $X_p = 4-6$ Aminosäuren

 $X_1 = G$, A oder P

 $X_2 = R, K, W, Q \text{ oder A ist}$

 $X_3 = E$ oder H ist.

Insbesondere bevorzugt werden Peptide mit den folgenden Sequenzen:

- 3 -

(a)hBD-5		
Z _{N2} -CRVRGGR	CAVLSCLPKEEQIGKC	STRGRKCC-Z

(b)hBD-6

30

- 5 Z_{N3}-CGYGTARCRKKCRSQEYRIGRCPNTYACC-Z_{C3}
 - (c) hBD-7 $Z_{\text{N4}}\text{-}\text{CRRSEGFCQEYCNYMETQVGYCSKKKDACC-} Z_{\text{C4}}$
- 10 (d)hBD-8 Z_{NS}-CKLGRGKCRKECLENEKPDGNCRLNFLCC-Z_{CS}
- (e) hBD-10

 Z_{N7}-CHMQQGICRLFFCHSGEKKRGICSDPWNRCC-Z_{C7}
 - (f) hBD-11 $Z_{N8}\text{-}CERPNGSCRDFCLETEIHVGRCLNSRPCC-}Z_{C8}$
- 20 (g)hBD-12 $Z_{N9}\text{-CNKLKGTCKNNCGKNEELIALCQKSLKCC-} Z_{C9}$
 - (h)hBD-13 $Z_{\text{N10}}\text{-}\text{CLNLSGVCRRDVCKVVEDQIGACRRRMKCC-Z}_{\text{C10}}$
- 25 (i) hBD-14 $Z_{N11}\text{-CWGKSGRCRTTCKESEVYYILCKTEAKCC-} Z_{C11}$
 - (j) hBD-15 $Z_{N12}\text{-CWNFRGSCRDECLKNERVYVFCVSGKLCC-} Z_{C12}$
 - (k) hBD-16 $Z_{\text{N13}}\text{-CWNNYVQGHCRKICRVNEVPEALCENGRYCC-}Z_{\text{C13}}$

	(1) 1 22 42
	(I) hBD-17 $Z_{N14}\text{-CWNLYGKCRYRCSKKERVYVYCINNKMCC-Z}_{C14}$
	ZN14-CVVIVLIGRER I RESKRERV I V I CINNKINCE-ZC14
5	(m)hBD-18
	Z _{N15} -CWNRSGHCRKQCKDGEAVKDTCKNLRACC-Z _{C1}
	(n)hBD-19
	Z_{N16} -CLMGLGRCRDHCNVDEKEIQKCKMKKCC- Z_{C16}
10	
	(o)hBD-20
	Z _{N17} -CWMDGHCRLLCKDGEDSIIRCRNRKRCC-Z _{C17}
	(p)Z _N Z _c hBD-22
	Z _{N19} -CMGNSGICRASCKKNEQPYLYCRNCQSCC-Z _{C19}
15	
	(q)hBD-23
	Z_{N20} -CWKGQGACQTYCTRQETYMHLCPDASLCC- Z_{C20}
	(r) hBD-24
20	Z_{N21} -CELYQGMCRNACREYEIQYLTCPNDQKCC- Z_{C21}
	(s) hBD-25
	Z _{N22} -CWIIKGHCRKNCKPGEQVKKPCKNGDYCC-Z _{C22}
	(t) hBD-26
25	Z _{N23} -CYYGTGRCRKSCKEIERKKEKCGEKHICC-Z _{C23}
	(u)hBD-27
	Z_{N24} -CLGLPKCWNYRCEPLHLAYAFYCLLPTSCC- Z_{C24}
30	(v)hBD-28

 Z_{N25} -CVSNTPGYCRTCCHWGETALFMCNASRKCC- Z_{C25}

- 5 -

(w)hBD-29

Z_{N26}-CWKNNVGHCRRRCLDTERYILLCRNKLSCC-Z_{C26}

(x) hBD-30

Z_{N27}-CFNKVTGYCRKKCKVGERYEIGCLSGKLCC-Z_{C27}

(y)hBD-31

Z_{N28}-CLNDVGICKKKCKPEEMHVKNGWAMCGKQRDCC-Z_{C28}

10 (z) hBD-32

Z_{N29}-CWNFRGSCRDECLKNERVYVFCVSGKLCC-Z_{C29}

wobei

15

5

 Z_{N2} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IINTLQKYY und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C2} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RRKK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

- Z_{N3} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EFELDRI und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,
- Z_{C3} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LRKWDESLLNRTKP und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{N4} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKVVD und seine N-terminal verkürzten

30 Fragmente, bedeutet,

 Z_{C4} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LH, bedeutet,

15

30

Z_{N5} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EFAVCES und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{CS} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RQRI und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

Z_{N7} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest NTI und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C7} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VSNTDEEGKEKPEMD und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{NB} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest GKFKEI und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C8} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LPLGHQPRIEST und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 $Z_{\rm N9}$ einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest NAFFDEK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C9} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RTIQP und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{N10} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest DLGPVEGH und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C10} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RTWWIL und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

WO 02/04487

15

 Z_{N11} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EVMK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C11} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VDPKYVPVKPKL und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{N12} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RIET und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

Z_{C12} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKPKDQPHLPQHIKN und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{N13} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest TEQLKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{C13} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LNIKELEA und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{N14} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest TPGGTQR und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{C14} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VKPKYQPKERWWPF und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{N15} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest PAYSGEKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{CIS} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IPSNEDHRRV und seine C-terminal verkürzten

30 Fragmente, bedeutet,

 Z_{N16} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest FIGLRR und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C16} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VGPKVVKLIK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{N17} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VE, bedeutet,

Z_{C17} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, 10 insbesondere den Peptidrest VPSR und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{N19} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest HILR und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{C19} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LQSYMR und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

20

 Z_{N20} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EFKR und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{C20} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LSYALK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{N21} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, 25 insbesondere den Peptidrest PWNP und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{C21} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKLSVK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

 Z_{N22} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest QKS und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C22} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IPSNTDS und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{N23} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest GWIRR und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C23} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VPKEKDK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{N24} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest QSS und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C24} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LE, bedeutet,

Z_{N25} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest GSK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C25} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest ISYSFLPK, bedeutet,

- Z_{N26} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest FEPQK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,
 - Z_{C26} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest ISIISHEY, bedeutet,
- Z_{N27} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,
 - Z_{C27} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest ANDEEEK, bedeutet,
- Z_{N28} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest WYVKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

- 10 **-**

Z_{C28} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VPADR, bedeutet,

 Z_{N29} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IET und seine N-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet,

Z_{C29} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LK, bedeutet,

und die zyklischen, amidierten, acetylierten, sulfatierten, phosphorylierten, glycosylierten, und oxydierten Derivate sowie Peptidfragmente, die aus den oben beschriebenen Aminosäuresequenzen abgeleitet werden.

Für die oben beschriebenen neuen Defensinpeptide wurden folgende kodierende Nukleinsäuresequenzen (cDNAs) gefunden, die auch Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind:

15

20

25

30

10

(a)hBD-5

ATGAGGATCCATTATCTTCTGTTTGCTTTGCTCTTCCTGTTTTTGGTGCCTGTTCC
AGGTCATGGAGGAATCATAAACACATTACAGAAATATTATTGCAGAGTCAGAGGC
GGCCGGTGTGCTCAGCTGCCTTCCAAAGGAGGAACAGATCGGCAAGTGC
TCGACGCGTGGCCGAAAATGCTGCCGAAGAAAGAAA

(b)hBD-6

(c) hBD-7

5 (e)hBD-10

10

15

20

(f) hBD-11

(g)hBD-12

CTCAAGACCCACCCAGTCATGAGGACTTTCCCTTTTCTCTTTGCCGTGCTCTTCT
TTCTGACCCCAGCCAAGAATGCATTTTTTGATGAGAAATGCAACAAACTTAAAGG
GACATGCAAGAACAATTGCGGGAAAAATGAAGAACTTATTGCTCTCTGCCAGAA
GTCTCTGAAATGCTGTCGGACCATCCAGCCATGTGGGAGCATTATAGAT

(h)hBD-13

(i) hBD-14

GAAGTCATGAAATGTTGGGGCAAGTCAGGCAGGTGCAGAACAACATGTAAAGAA
AGTGAAGTATACTATATTATGCAAAACTGAGGCTAAGTGCTGTGGGATCCCA
AGTATGTACCTGTAAAACCAAAATTAACAGACACAAATACAAGCCTGGAATCAAC

- 12 -

TTCTGCAGTCTGACACCTCTCCCAACCTTGAGTCTCAACATCATGGGATCCTG
CAGTTCTAT

(j) hBD-15

5 GCAGGATTGAAACATGTTGGAATTTTCGTGGCTCCTGCCGTGACGAATGCCTGA
AGAATGAAAGGGTCTATGTTTTCTGCGTGAGTGGTAAACTGTGCTGTTTGAAGCC
CAAGGACCAGCCACATTTACCACAGCATATAAAGAAT

(k)hBD-16

(I) hBD-17

GGACTTGCAGCTTCATTTTGGGCTGCCTTAGCCATGAAGCTCCTTTTGCTGACTT
TGACTGTGCTGCTGCTCTTATCCCAGCTGACTCCAGGTGGCACCCAAAGATGCTG
GAATCTTTATGGCAAATGCCGTTACAGATGCTCCAAGAAGGAAAGAGTCTATGTT
TACTGCATAAATAATAAAATGTGCTGCGTGAAGCCCAAGTACCAGCCAAAAGAAA
GGTGGTGGCCATTT

25 (m)hBD-18

20

30

(n)hBD-19

5

10

15 (o)hBD-20

20

25

(p)hBD-22

30 (q)hBD-23

5 (r) hBD-24

CCTTGGAATCCATGTGAGCTTTACCAAGGCATGTGCAGAAACGCCTGCAGAGAA
TATGAAATCCAATACTTAACCTGCCCAAATGATCAAAAGTGCTGCCTGAAACTTTC
TGTGAAAATAACCAGTTCTAAAAATGTGAAGGAGGATTACGACTCTAACTCCAAC
TTGTCAGTTACAAACAGTTCAAGCTACTCTCACATT

10

(s) hBD-25

CCAAAAATCTTGCTGGATCATAAAAGGACACTGCAGGAAAAACTGCAAACCTGGT GAACAGGTTAAAAAGCCATGTAAAAATGGTGACTATTGCTGCATTCCAAGCAACA CAGATTCT

15

20

25

30

(t) hBD-26

(u)hBD-27

CAATCCTCCTGCCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGAATTATAGGTGTGAGCCACTGC
ACCTGGCCTATGCCTTTTATTGCCTCCTGCCTACCTCCTGCTGTTTGGAATGTGA
AAGCAAGACTGGAGCTCTACCTTGGACTATGAAAAACAAGGACCTCACC

(v)hBD-28

GGGTCAAAATGTGTGAGTAACACCCCAGGATACTGCAGGACATGTTGCCACTGG
GGGGAGACAGCATTGTTCATGTGCAACGCTTCCAGAAAATGCTGCATCAGCTACT
CCTTCCTGCCGAAGCCTGACCTACCACAGCTCATCGGTAACCACTGGCAATCAAG
GAGAAGAAACACACAAAGGAAAGACAAGAAGCAACAAACGACCGTAACATCA

- 15 -

(w)hBD-29

TTTGAACCCCAAAAATGTTGGAAGAATAATGTAGGACATTGCAGAAGACGATGTT
TAGATACTGAAAGGTACATACTTCTTTGTAGGAACAAGCTATCATGCTGCATTTCT
ATAATATCACATGAATATACTCGACGACCAGCATTTCCTGTGATTCACCTAGAGG
ATATAACATTGGATTATAGTGATGTGGACTCTTTTACTGGTTCCCCAGTATCTATG
TTGAATGATCTGATAACATTTGACACAACTAAATTTGGAGAAACCATGACACCTG
AGACCAATACTCCTGAGACTACTATGCCACCATCTGAGGCCACCACCTTCTCAG
ACAGCTCTTACTCATAAT

10

15

20

25

30

5

(x) hBD-30

CTCAAAAAATGCTTCAATAAAGTAACAGGCTATTGCAGGAAGAAATGCAAG GTAGGAGAAAGATATGAAATAGGATGTCTAAGTGGGAAATTATGTTGTGCT AATGATGAAGAAGAAAAAACATGTGTCATTTAAGAAGCCACATCAACATT CTGGTGAGAAGCTGAGTGTGCTGCAGGATTACATCATCTTACCCACCATCA CCATTTTCACAGTC

(y)hBD-31

ATGAAGTCCCTACTGTTCACCCTTGCAGTTTTTATGCTCCTGGCCCAATTGG
TCTCAGGTAATTGGTATGTGAAAAAAGTGTCTAAACGACGTTGGAATTTGCAA
GAAGAAGTGCAAACCTGAAGAGATGCATGTAAAGAATGGTTGGGCAATGTG
CGGCAAACAAAGGGACTGCTGTGTTCCAGCTGACAGACGTGCTAATTATCC
TGTTTTCTGTGTCCAGACAAAGACTACAAGAATTTCAACAGTAACAGCAACA
ACAGCAACAACAACTTTGATGATGACTACTGCTTCGATGTCTTCGATGGCTC
CTACCCCCGTTTCTCCCACTGGT

(z) hBD-32

ATTGAAACATGTTGGAATTTTCGTGGCTCCTGCCGTGACGAATGCCTGAAG

AATGAAAGGGTCTATGTTTTCTGCGTGAGTGGTAAACTGTGCTGTTTGAAGC

CCAAGGACCAGCCACATTTACCACAGCATATAAAGAAT

10

15

20

WO 02/04487 PCT/EP01/07973

Während durch die Analyse der entsprechenden kodierenden Nukleotidsequenzen die Gene der neuen Defensinpeptide hBD-5, hBD-6, hBD-7, hBD-8, hBD-10, hBD-11, hBD-12und hBD-13, auf Chromosom 8 gefunden wurden, konnten die Gene der erfindungsgemäßen neuen Defensinpeptide hBD-14, hBD-15, hBD-16, hBD-17, hBD-18, hBD-19, hBD-20, hBD-22, hBD-23, hBD-24, hBD-25, hBD-26, hBD-27, hBD-28, hBD-29, hBD-30, hBD-31 und hBD-32 überraschenderweise Chromosom 20 zugeordnet werden.

Damit ist weiter Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die neuen Peptide hBD-5 bis hBD-32 bereitzustellen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß diese jeweils als ein gut zugängliches Arzneimittel mit biologisch und therapeutischer Aktivität eines natürlichen Stoffes verwanden werden können.

Die vorliegende Erfindung stellt des weiteren ein Herstellungsverfahren für die erfindungsgemäßen Peptide sowie die Verwendung der erfindungsgemäßen Peptide als Arzneimittel für verschiedene therapeutische und diagnostische Indikationen bereit. Dazu können die Defensinpeptide als hochreine Stoffe oder - wenn für die bestimmte Verwendung ausreichend - innerhalb eines teilweise aufgereinigten Peptidgemisches oder als Gemisch mehrerer der erfindungsgemäßen hochreinen Defensinpeptide verwandt werden.

Die erfindungsgemäßen Peptide können eingesetzt werden zur Behandlung von Erkrankungen, die bei bakteriellen Organbesiedlungen entstehen.

Die erfindungsgemäßen Peptide sind weiterhin einsetzbar zur Behandlung von Erkrankungen des menschlichen Organismus, insbesondere mit Beteiligung des Magen-Darm-Traktes, der Atemwege und des Urogenitalapparates.

Die erfindungsgemäßen Peptide können in einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung eingesetzt werden zur Behandlung von Erkrankungen des menschlichen Organismus, insbesondere mit Beteiligung des Intugementes und seiner Anhangsdrüsen.

- 17 -

Die erfindungsgemäßen Peptide können auch eingesetzt werden zur Behandlung von Systemerkrankungen bei Überproduktion oder Mangel der Defensinpeptide, insbesondere durch gegen die Defensinpeptide gebildete Antikörper oder zur Verwendung in der Substitutionstherapie.

5

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung können die erfindungsgemäßen Peptide zur Behandlung von chronischen Erkrankungen, teils vergesellschaftet mit den bereits erwähnten Erkrankungen eingesetzt werden, indem diese in geeigneter Form für die Behandlung benutzt werden.

10

15

30

Die erfindungsgemäßen Peptide können weiterhin eingesetzt werden zur Behandlung von Erkrankungen im akuten Stadium.

Die erfindungsgemäßen Peptide können eingesetzt werden zur Behandlung der Störung der Fertilität, insbesondere bei Krankheiten der mit Oocyten verbundenen Spermienpenetrationsstörungen und Inidationsstörungen sowie Maturationsstörungen im männlichen Reproduktionsapparates, sowie als Kontrazeptivum.

Die erfindungsgemäßen Peptide können eingesetzt werden zur Diagnose der bereits erwähnten Erkrankungen, indem beispielsweise Antikörper gegen eines oder mehrere der erfindungsgemäßen Peptide oder seiner Derivate oder ihrer Fragmente hergestellt werden und die Blutkonzentration eines oder mehrerer der erfindungsgemäßen Peptide über immunologische Verfahren gemessen wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiter verschiedene Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen neuen Defensinpeptide oder ihrer Derivate dadurch gekennzeichnet, dass dieses über eine prokaryontische oder eine eukaryontische Expression hergestellt und chromatographisch gereinigt werden, sowie ein weiteres Verfahren zur Herstellung der Defensinpeptide ihrer Derivate, indem man sie aus menschlichem Blut über Chromatographie-

WO 02/04487

5

10

PCT/EP01/07973

Verfahren in bekannter Weise isoliert, und schließlich ein Verfahren zur Herstellung der Defensinpeptide oder ihrer Derivate, indem man diese Defensinpeptide durch die üblichen Verfahren der Festphasen- und Flüssigphasen-Synthese aus den geschützten Aminosäuren, die in der angegebenen Sequenz enthalten sind, herstellt, deblockiert und es mit den gängigen Chromatographie-Verfahren reinigt.

Die Defensinpeptide werden chemisch synthetisiert und als Arzneimittel zubereitet. Auch die gentechnologische Herstellung durch Verwendung übliche Vektoren ist erarbeitet. Auf diesem Wege wird die neuen Defensinpeptide sowohl (1) in prokaryontischen als auch (2) in eukaryontischen Organismen hergestellt. Hierfür stehen verschiedene Expressionsvektoren routinemässig zur sekretorischen oder direkten cytoplasmatischen Expression zur Verfügung.

Arzneimittelzubereitungen enthalten eines oder mehrere der 15 Defensinpeptide oder ein physiologisch erfindungsgemäßen neuen verträgliches Salz dieser Peptide. Die Form und Zusammensetzung der Arzneimittel, welche eines oder mehrere der neuen Defensinpeptide enthalten, richtet sich nach der Art der Verabreichung. Die Arzneimittel eines oder mehrere der neuen Defensinpeptide enthaltend können parenteral, intranasal, 20 oral und mittels Inhalation verabreicht werden. Vorzugsweise werden diese Arzneimittel enthaltend eines oder mehrere der neuene Defensinpeptide mit einem Injektionspräparat, entweder als Lösung oder als Lyophilisat zur Auflösung unmittelbar vor Gebrauch konfektioniert. Die Arzneimittelzubereitungen können außerdem Hilfsstoffe enthalten, 25 abfülltechnisch bedingt sind, einen Beitrag zur Löslichkeit, Stabilität oder Sterilität des Arzneimittels leisten oder den Wirkungsgrad der Aufnahme in den Körper erhöhen.

Die zu verabreichende Tagesdosis für die erfindungsgemäßen Defensinpeptide hängt von der Indikation und der Anwendung bestimmter Derivate ab. Bei i.v./i.m. Injektion liegt sie im Bereich von 100 bis 1200 Einheiten (µg)/Tag, bei

täglicher subcutaner Injektion vorzugsweise bei 300 - 2400 Einheiten $(\mu g)/Tag$.

Die Bestimmung der biologischen Aktivität für die erfindungsgemäßen neuen 5 Defensinpeptide basiert auf Messungen gegen international gebräuchliche Referenzpräparationen für antibiotische Substanzen. Die erfindungsgemäßen neuen Defensinpeptide hBD-5, hBD-6, hBD-7, hBD-8, hBD-10, hBD-11, hBD-12, hBD-13, hBD-14, hBD-15, hBD-16, hBD-17, hBD-18, hBD-19, hBD-20, hBD-22, hBD-23, hBD-24, hBD-25, hBD-26, hBD-27, 10 hBD-28, hBD-29, hBD-30, hBD-31und hBD-32, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich besonders auch für die Langzeit-Therapie Infektionserkrankungen eignen, da sie über eine ausgezeichnete biologische Wirksamkeit verfügen und andererseits auch bei Dauerbehandlung keine Immunreaktion auslösen.

15

Aufgrund der biologischen Wirkung der erfindungsgemäßen Defensinpeptide ist gezeigt, dass die erfindungsgemäßen Präparate weiter als Mittel zur Therapie von infektiösen Erkrankungen vieler Epithelorgane anwendbar sind.

Zur Bestimmung der Aktivität wurden beispielhaft die Peptide hBD10, hBD17 und hBD19 auf ihre antimikrobielle Wirkung hin getestet. Im Radial-Diffusions-Assay konnten die in Tabelle 1 angegebenen Aktivitäten der Peptide gegen verschiedene Bakterienstämme gemessen werden. Dabei bedeutet (+) die Bildung eines Hemmhofes und (-) keine Bildung eines Hemmhofs. Tabelle 1

	hBD10	hBD17	hBD19
Escherichia coli	(+)	(+)	. (+)
Staphylococcus carnosus	(+)	(+)	(+)
Saccharomyces cerevisiae	(+)	(+)	(-)

Für eine genauere Bestimmung der antibiotischen Aktivität wurde die minimale inhibitorische Konzentration (MIC) der o.g. Defensine nach Standardmethoden bestimmt. Die Befunde sind in Tabelle 2 angegeben, wobei die MIC-Werte Konzentrationen in [µg/ml] entsprechen (nd = nicht gemessen).Tabelle 2

	hBD10	hBD17	hBD19
Escherichia coli	nd	nd	nd
Staphylococcus carnosus	<50	<25	<25
Saccharomyces cerevisiae	nd	nd	nd

Weiterhin wurden Strukturanalysen mit hBD16 durchgeführt. Abbildung 1 zeigt die in Lösung gefundene NMR-Struktur von hBD16.

Die räumliche Lage der Cysteine Cys 6, 15, 29 und 35 zeigt, dass die Verbrückung dieser Positionen nicht zwingend eine Strukturveränderung bedeuten muss, die zu einer Verminderung der Aktivität führt. Dieses konnte anhand des Vergleichs zweier Verbrückungsmuster gezeigt werden (Figur 2).

<u>Patentansprüche</u>

5 1. Peptide mit der Aminosäuresequenz

$$Z_{N}$$
-C- X_{m} - X_{1} -X-C- X_{2} - X_{n} -C- X -X- X - X_{3} - X_{o} -C- X_{p} -C-C- Z_{C}

wobei Z_N ein Aminosäurerest oder ein Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren , Z_C ein Aminosäurerest oder ein Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren,

10 X = eine beliebige Aminosäure

 $X_m = 3-6$ beliebige Aminosäuren

 $X_n = 2-3$ Aminosäuren

 $X_o = 5-9$ Aminosäuren

 $X_p = 4-6$ Aminosäuren

15 $X_1 = G$, A oder P

 $X_2 = R$, K, W, Q oder A ist

 X_3 = E oder H ist.

- 2. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäureseguenz
- 20 (aa) hBD-5

Z_{N2}-CRVRGGRCAVLSCLPKEEQIGKCSTRGRKCC-Z_{C2}

 Z_{N2} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IINTLQKYY und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C2} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RRKK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet bedeutet.

3. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

25

- 22 -

(bb) hBD-6

Z_{N3}-CGYGTARCRKKCRSQEYRIGRCPNTYACC-Z_{C3}

 Z_{N3} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EFELDRI und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C3} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LRKWDESLLNRTKP und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

4. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

10 (cc) hBD-7

Z_{N4}-CRRSEGFCQEYCNYMETQVGYCSKKKDACC-Z_{C4}

 Z_{N4} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKVVD und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C4} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LH, bedeutet.

Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (dd)hBD-8

Z_{N5}-CKLGRGKCRKECLENEKPDGNCRLNFLCC-Z_{CS}

 Z_{NS} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EFAVCES und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{CS} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RQRI und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

25

30

15

6. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

(ee) hBD-10

Z_{N7}-CHMQQGICRLFFCHSGEKKRGICSDPWNRCC-Z_{C7}

 Z_{N7} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest NTI und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C7} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VSNTDEEGKEKPEMD und seine C-

- 23 -

terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

7. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

(ff) hBD-11

Z_{N8}-CERPNGSCRDFCLETEIHVGRCLNSRPCC-Z_{C8}

 Z_{N8} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest GKFKEI und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C8} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LPLGHQPRIEST und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz
 (gg)hBD-12

Z_{N9}-CNKLKGTCKNNCGKNEELIALCQKSLKCC-Z_{C9}

Z_{N9} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest NAFFDEK und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C9} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RTIQP und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

20

25

5

10

 Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (hh)hBD-13

Z_{N10}-CLNLSGVCRRDVCKVVEDQIGACRRRMKCC-Z_{C10}

 Z_{N10} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest DLGPVEGH und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C10} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RTWWIL und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

- 10. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz
 - (ii) hBD-14

Z_{N11}-CWGKSGRCRTTCKESEVYYILCKTEAKCC-Z_{C11}

- 24 -

 Z_{N11} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EVMK und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C11} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VDPKYVPVKPKL und seine Cterminal verkürzten Fragmente bedeutet.

11. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

(jj)hBD-15

Z_{N12}-CWNFRGSCRDECLKNERVYVFCVSGKLCC-Z_{C12}

Z_{N12} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest RIET und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C12} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKPKDQPHLPQHIKN und seine C-terminal verkürzten Fragmente bedeutet.

15

20

25

10

12. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (kk)hBD-16

Z_{N13}-CWNNYVQGHCRKICRVNEVPEALCENGRYCC-Z_{C13}

 Z_{N13} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest TEQLKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C13} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LNIKELEA und seine C-terminal verkürzten Fragmente bedeutet.

13. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

(II) hBD-17

Z_{N14}-CWNLYGKCRYRCSKKERVYVYCINNKMCC-Z_{C14}

 Z_{N14} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest TPGGTQR und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C14} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VKPKYQPKERWWPF und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

 Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (mm)hBD-18

Z_{N15}-CWNRSGHCRKQCKDGEAVKDTCKNLRACC-Z_{C15}

Z_{N15} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest PAYSGEKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C15} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IPSNEDHRRV und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

10

15. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (nn)hBD-19

Z_{N16}-CLMGLGRCRDHCNVDEKEIQKCKMKKCC-Z_{C16}

 Z_{N16} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest FIGLRR und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C16} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VGPKVVKLIK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

20 16. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (oo)hBD-20

Z_{N17}-CWMDGHCRLLCKDGEDSIIRCRNRKRCC-Z_{C17}

 Z_{N17} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VE und Z_{C17} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VPSR und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

- 17. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (pp)hBD-22
- Z_{N19}-CMGNSGICRASCKKNEQPYLYCRNCQSCC-Z_{C19}
 Z_{N19} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest HILR und seine N-terminal verkürzten Fragmente,

- 26 -

bedeutet und Z_{C19} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LQSYMR und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

18. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (qq)hBD-23

Z_{N20}-CWKGQGACQTYCTRQETYMHLCPDASLCC-Z_{C20}

 Z_{N20} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest EFKR und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C20} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LSYALK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

19. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

15 (rr)hBD-24

10

20

30

Z_{N21}-CELYQGMCRNACREYEIQYLTCPNDQKCC-Z_{C21}

 Z_{N21} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest PWNP und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C21} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKLSVK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

20. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (ss)hBD-25

25 Z_{N22}-CWIIKGHCRKNCKPGEQVKKPCKNGDYCC-Z_{C22}

 Z_{N22} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest QKS und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C22} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IPSNTDS und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

21. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

(tt)hBD-26

Z_{N23}-CYYGTGRCRKSCKEIERKKEKCGEKHICC-Z_{C23}

Z_{N23} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest GWIRR und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C23} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VPKEKDK und seine C-terminal verkürzten Fragmente, bedeutet.

22. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz

10 (uu)hBD-27

15

Z_{N24}-CLGLPKCWNYRCEPLHLAYAFYCLLPTSCC-Z_{C24}

 Z_{N24} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest QSS und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C24} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LE, bedeutet.

23. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (vv)hBD-28

Z_{N25}-CVSNTPGYCRTCCHWGETALFMCNASRKCC-Z_{C25}

Z_{N25} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest GSK und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C25} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest ISYSFLPK, bedeutet.

24. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (ww)hBD-29

Z_{N26}-CWKNNVGHCRRRCLDTERYILLCRNKLSCC-Z_{C26}

Z_{N26} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest FEPQK und seine N-terminal verkürzten
 Fragmente und Z_{C26} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest ISIISHEY, bedeutet.

- 28 -

25. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (xx)hBD-30

Z_{N27}-CFNKVTGYCRKKCKVGERYEIGCLSGKLCC-Z_{C27}

 Z_{N27} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C27} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest ANDEEEK, bedeutet.

26. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz (yy)hBD-31

Z_{N28}-CLNDVGICKKKCKPEEMHVKNGWAMCGKQRDCC-Z_{C28}

 Z_{N28} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest WYVKK und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C28} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest VPADR, bedeutet.

- 27. Peptid nach Anspruch 1 mit der Aminosäuresequenz
- (zz) hBD-32

10

15

30

Z_{N29}-CWNFRGSCRDECLKNERVYVFCVSGKLCC-Z_{C29}

- Z_{N29} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest IET und seine N-terminal verkürzten Fragmente und Z_{C29} einen Aminosäurerest oder einen Peptidrest von bis zu 30 Aminosäuren, insbesondere den Peptidrest LK, bedeutet.
- 28. Peptide nach einem der Ansprüche 1 bis 27, wobei die Peptide die zyklischen, amidierten, acetylierten, sulfatierten, phosphorylierten, glycosylierten, und oxydierten Derivate sowie Peptidfragmente, die aus den oben beschriebenen Aminosäuresequenzen abgeleitet werden und eine ähnliche biologische Aktivität aufweisen, sind.
 - 29. Verfahren zur Herstellung der Defensinpeptide oder ihrer Derivate und Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch

WO 02/04487

5

10

20

25

- 29 -

gekennzeichnet, dass diese über eine prokaryontische oder eine eukaryontische Expression hergestellt und gereinigt werden.

- 30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass man die Peptide aus menschlichem Blut über an sich bekannte übliche Chromatographie-Verfahren in bekannter Weise isoliert.
- 31. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass man die Defensinpeptide oder ihre Derivate durch die üblichen Verfahren der chemischen Festphasen- und Flüssigphasen-Peptidsynthese aus den geschützten Aminosäuren, die in den angegebenen Sequenzen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 enthalten sind, herstellt, deblockiert und es mittels an sich bekannter Verfahren reinigt.
- 32. Arzneimittel, enthaltend eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 als aktiven Wirkstoff neben üblichen Hilfs- und Zusatzstoffen.
 - 33. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Behandlung von Erkrankungen, die bei bakteriellen Organbesiedlungen entstehen.
 - 34. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Behandlung von Erkrankungen des menschlichen Organismus, insbesondere mit Beteiligung des Magen-Darm-Traktes, der Atemwege und des Urogenitalapparates.
- 35. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Behandlung von Erkrankungen des menschlichen Organismus, insbesondere

- 30 -

mit Beteiligung des Intugementes und seiner Anhangsdrüsen.

- 36. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Behandlung von Systemerkrankungen bei Überproduktion oder Mangel der Defensinpeptide, insbesondere durch gegen die Defensinpeptide gebildete Antikörper oder zur Verwendung der Defensinpeptide nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Substitutionstherapie.
- 37. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Behandlung von chronischen Erkrankungen, teils vergesellschaftet mit Erkrankungen gemäß Ansprüchen 33 bis 36, indem es in geeigneter Form für die Behandlung benutzt wird.

15

25

38. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Behandlung von akuten Erkrankungen gemäß Ansprüchen 33 bis 37, indem es in geeigneter Form für die Behandlung in der Intensivpflege dieser Erkrankungen benutzt wird.

- 39. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Behandlung der Störung der Fertilität, insbesondere bei Krankheiten der mit Oocyten verbundenen Spermienpenetrationsstörungen und Inidationsstörungen sowie Maturationsstörungen im männlichen Reproduktionsapparates, sowie als Kontrazeptivum.
- 40. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 zur Diagnose von Erkrankungen, insbesondere nach den Ansprüchen 33 bis 39, indem spezifische Antikörper gegen eines oder mehrerer der Defensinpeptide

- 31 -

nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 oder seiner Derivate oder seiner Fragmente hergestellt werden und die Blutkonzentration eines oder mehrerer der Defensinpeptide nach einem der Ansprüche 1 bis 28 über immunologische Verfahren gemessen wird.

5

10

- 41. Verwendung eines oder mehrerer der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 in verschiedenen galenischen Applikationsformen, insbesondere der lyophilisierten, mit Mannit aufgenommenen Form in sterilen Ampullen zur Auflösung in physiologischer Kochsalzlösung und/oder Infusionslösungen zur wiederholten Einzelinjektion und/oder Dauerinfusion in Mengen von 300 Mikrogramm bis 300 Milligramm eines oder mehrerer der Defensinpeptide nach Anspruch 1 pro Therapie-Einheit.
- 42. Verwendung der von den Defensinpeptiden nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28 abgeleiteten Gensonden und Genen zur lokalen und systemischen Gentherapie der Indikationen gemäß einem der Ansprüche 33 bis 39 in epithelialen Geweben und Organen.
- 20 43. Nukleinsäuresequenz codierend für eines oder mehrere der Defensinpeptide oder seiner Derivate oder seiner Fragmente nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 28

44. Nukleinsäure mit der Sequenz

25 ATGAGGATCCATTATCTTCTGTTTGCTTTTGCTCTCTTTTTTGGTGCCTGTTCCAG
GTCATGGAGGAATCATAAACACATTACAGAAATATTATTGCAGAGTCAGAGGCGGCC
GGTGTGCTGAGCTGCCTTCCAAAGGAGGAACAGATCGGCAAGTGCTCGACG
CGTGGCCGAAAATGCTGCCGAAGAAAGAAA
kodierend für das Defensinpeptid hBD-5.

30

- 32 -

kodierend für das Defensinpeptid hBD-6.

5

46. Nukleinsäure mit der Sequenz

- 10 kodierend für das Defensinpeptid hBD-7.
 - 47. Nukleinsäure mit der Sequenz

15 GGATC

kodierend für das Defensinpeptid hBD-8.

- 48. Nukleinsäure mit der Sequenz
- AAATACCATCTGCCGTATGCAGCAAGGGATCTGCAGACTTTTTTTCTGCCATTCTGGT

 20 GAGAAAAAGCGTGACATTTGCTCTGATCCCTGGAATAGGTGTTGCGTATCAAATACA
 GATGAAGAAGGAAAAGAGAAACCAGAGATGGATGGCAGATCTGGGATCTAAAATAT
 AAGCTCCC

kodierend für das Defensinpeptid hBD-10.

- 49. Nukleinsäure mit der Sequenz
 - AGGGGAGCGGGCTACTCACCTCCAGCCTTTTGTCATCCAGGGGCAAATTCAAGGAG ATCTGTGAACGTCCAAATGGCTCCTGTCGGGACTTTTGCCTCGAAACAGAAATCCAT GTTGGGAGATGTTTAAATAGCCGACCCTGCTGCCTGCCTCTGGGGCATCAACCAAGA ATTGAGAGCACTACACCCAAAAAGGAC
- 30 kodierend für das Defensinpeptid hBD-11.
 - 50. Nukleinsäure mit der Sequenz

CTCAAGACCCACCCCAGTCATGAGGACTTTCCCTTTTCTCTTTGCCGTGCTCTTCTTT CTGACCCCAGCCAAGAATGCATTTTTTGATGAGAAATGCAACAAACTTAAAGGGACA TGCAAGAACAATTGCGGGAAAAATGAAGAACTTATTGCTCTCTGCCAGAAGTCTCTG AAATGCTGTCGGACCATCCAGCCATGTGGGAGCATTATAGAT

- 5 kodierend für das Defensinpeptid hBD-12.
 - 51. Nukleinsäure mit der Sequenz

GTGATTTGGGTCCTGTGGAAGGTCATTGTCTCAATTTGTCTGGTGTTTTGCAGAAGAG ATGTCTGCAAAGTAGTAGAAGATCAAATTGGTGCCTGCCGAAGAAGGATGAAGTGTT GTAGAACATGGTGGATTTTAATGCCAATTCCAACACCACTTATCATGTCAGATTATCA AGAACCCCTTAAACATAAGTTGAAA

kodierend für das Defensinpeptid hBD-13.

- 52. Nukleinsäure mit der Sequenz

20

30

10

53. Nukleinsäure mit der Sequenz

GCAGGATTGAAACATGTTGGAATTTTCGTGGCTCCTGCCGTGACGAATGCCTGAAGA ATGAAAGGGTCTATGTTTTCTGCGTGAGTGGTAAACTGTGCTGTTTGAAGCCCAAGG ACCAGCCACATTTACCACAGCATATAAAGAAT

- 25 kodierend für das Defensinpeptid hBD-15.
 - 54. Nukleinsäure mit der Sequenz

TGAGGAAGGTAGCATAGTGTGCAGTTCACTGGACCAAAAGCTTTGGCTGCACCTCTT
CTGGAAAGCTGGCCATGGGGTCTTCATGATCATTGCAATTCTGCTGTTCCAGAAACC
CACAGTAACCGAACAACTTAAGAAGTGCTGGAATAACTATGTACAAGGACATTGCAG
GAAAATCTGCAGAGTAAATGAAGTGCCTGAGGCACTATGTGAAAATGGGAGATACTG
TTGCCTCAATATCAAGGAACTGGAAGCATGTAAAAAAATTACAAAGCCACCTCGTCC

AAAGCCAGCAACACTTGCACTGACTCTTCAAGACTATGTTACAATAATAGAAAATTTC CCAAGCCTGAAGACACAGTCTACA

kodierend für das Defensinpeptid hBD-16.

kodierend für das Defensinpeptid hBD-17.

CATTT

10

56. Nukleinsäure mit der Sequenz

TTCCCAAGGACCATGAAACTCCTGCTGCTGCTCTTCCTATGCTTGTGCTCCTACCCC

AAGTGATCCCAGCCTATAGTGGTGAAAAAAAATGCTGGAACAGATCAGGGCACTGCA
GGAAACAATGCAAAGATGGAGAAGCAGTGAAAGATACATGCAAAAAATCTTCGAGCTT
GCTGCATTCCATCCAATGAAGACCACAGGCGAGTTCCTGCGACATCTCCCACACCCT
TGAGTGACTCAACACCAGGAATTATTGATGATATTTTAACAGTAAGGTTCACGACAG
ACTACTTTGAAGTAAGCAGCAAGAAAGATATGGTTGAAGAGTCTGAGGCGGGAAGG

GGAACTGAGACCTCTCTTCCAAATGTTCACCATAGCTCA
kodierend für das Defensinpeptid hBD-18.

57. Nukleinsäure mit der Sequenz

- 35 -

AGATTCTGCCACTGCCACCACCACCACCACCACCACCAACATACTGCCAAC
ACCATCACTGGAGCTAGAGGAAGCAGAAGAGCAG
kodierend für das Defensinpeptid hBD-19.

- 5 58. Nukleinsäure mit der Sequenz
 TAGAGTGTTGGATGGATGGACACTGCCGGTTGTTGTGCAAAGATGGTGAAGACAGC
 ATCATACGCTGCCGAAATCGTAAACGGTGCTGTTCCTAGTCGTTATTTAACAATCC
 AACCAGTAACAATTCATGGAATCCTTGGCTGGACCACTCCTCAGATGTCCACAACAG
 CTCCAAAAATGAAGACAAATATAACTAATAGATAGAAA
- 10 kodierend für das Defensinpeptid hBD-20.

20

60. Nukleinsäure mit der Sequenz

TGAATTCAAACGGTGCTGGAAGGGTCAAGGGGCCTGCCAAACTTACTGCACAAGGC AAGAAACTTACATGCACCTGTGCCCGGATGCGTCCCTGTGCTGTCTCTCTATGCAT TGAAACCTCCACCGGTCCCCAAGCATGAATATGAG

- 25 kodierend für das Defensinpeptid hBD-23.
 - 61. Nukleinsäure mit der Sequenz

CCTTGGAATCCATGTGAGCTTTACCAAGGCATGTGCAGAAACGCCTGCAGAGAATAT GAAATCCAATACTTAACCTGCCCAAATGATCAAAAGTGCTGCCTGAAACTTTCTGTGA

AAATAACCAGTTCTAAAAATGTGAAGGAGGATTACGACTCTAACTCCAACTTGTCAGT
TACAAACAGTTCAAGCTACTCTCACATT
kodierend für das Defensinpeptid hBD-24.

- 36 -

- 62. Nukleinsäure mit der Sequenz
- CCAAAAATCTTGCTGGATCATAAAAGGACACTGCAGGAAAAACTGCAAACCTGGTGA ACAGGTTAAAAAGCCATGTAAAAATGGTGACTATTGCTGCATTCCAAGCAACACAGA
- 5 TTCT

30

kodierend für das Defensinpeptid hBD-25.

- 63. Nukleinsäure mit der Sequenz
- ATGGATGGATCAGAAGGTGCTATTATGGAACTGGCAGATGCAGGAAATCATGCAAA

 GAAATTGAGAGGAAGAAAAAATGTGGGGAAAAACATATTTGCTGTGTCCCTAAA

 GAAAAGGATAAACTATCACACATTCACGACCAAAAAGAGACAAGTGAGCTATATATC

 kodierend für das Defensinpeptid hBD-26.
 - 64. Nukleinsäure mit der Sequenz
- CAATCCTCCTGCCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGAATTATAGGTGTGAGCCACTGCAC
 CTGGCCTATGCCTTTTATTGCCTCCTGCCTACCTCCTGCTGTTTGGAATGTGAAAGCA
 AGACTGGAGCTCTACCTTGGACTATGAAAAACAAGGACCTCACC
 kodierend für das Defensinpeptid hBD-27.
- 65. Nukleinsäure mit der Sequenz

 GGGTCAAAATGTGTGAGTAACACCCCAGGATACTGCAGGACATGTTGCCACTGGGG
 GGAGACAGCATTGTTCATGTGCAACGCTTCCAGAAAATGCTGCATCAGCTACTCCTT
 CCTGCCGAAGCCTGACCTACCACAGCTCATCGGTAACCACTGGCAATCAAGGAGAA
 GAAACACACAAAGGAAAGACAAGAAGCAACAAACGACCGTAACATCA
- kodierend für das Defensinpeptid hBD-28.
 - 66. Nukleinsäure mit der Sequenz
 - TTTGAACCCCAAAAATGTTGGAAGAATAATGTAGGACATTGCAGAAGACGATGTTTA
 GATACTGAAAGGTACATACTTCTTTGTAGGAACAAGCTATCATGCTGCATTTCTATAA
 TATCACATGAATATACTCGACGACCAGCATTTCCTGTGATTCACCTAGAGGATATAAC
 ATTGGATTATAGTGATGTGGACTCTTTTACTGGTTCCCCAGTATCTATGTTGAATGAT

CTGATAACATTTGACACAACTAAATTTGGAGAAACCATGACACCTGAGACCAATACTC

- 37 -

CTGAGACTACTATGCCACCATCTGAGGCCACTACTCCCGAGACTACTATGCCACCAT
CTGAGACTGCTACTTCCGAGACTATGCCACCACCTTCTCAGACAGCTCTTACTCATAA
T

kodierend für das Defensinpeptid hBD-29.

5

10

67. Nukleinsäure mit der Sequenz

CTCAAAAAATGCTTCAATAAAGTAACAGGCTATTGCAGGAAGAAATGCAAGGTAGGA GAAAGATATGAAATAGGATGTCTAAGTGGGAAATTATGTTGTGCTAATGATGAAGAA GAGAAAAAACATGTGTCATTTAAGAAGCCACATCAACATTCTGGTGAGAAGCTGAGT GTGCTGCAGGATTACATCATCTTACCCACCATCACCATTTTCACAGTC kodierend für das Defensinpeptid hBD-30.

68. Nukleinsäure mit der Sequenz

20 kodierend für das Defensinpeptid hBD-31.


69. Nukleinsäure mit der Sequenz

ATTGAAACATGTTGGAATTTTCGTGGCTCCTGCCGTGACGAATGCCTGAAGAATGAA AGGGTCTATGTTTTCTGCGTGAGTGGTAAACTGTGCTGTTTGAAGCCCAAGGACCAG

25 CCACATTTACCACAGCATATAAAGAAT kodierend für das Defensinpeptid hBD-32.


-1/2-

hBD16-norm



Figur 1

- 2 / 2 -



HBD-16:

hBD-16: green

with S-S-bonds between residues: 6-35, 15-29, 19-36

hBD-16: red

with S-S-bonds between residues: 6-15, 29-35, 19-36

Figur 2

5